

## Scoringsprocedure HSDQ

### STAP 1: Is er een algemene slaapstoornis?

1. Tel alle item-scores op en deel de som door 32;
2. Bepaal of dit gemiddelde de criterium-waarde overschrijdt.

**Criterium<sup>1</sup>**  
2.02

### STAP 2: is (zijn) er specifieke slaapstoornis(-sen)?

Indien stap 1 met 'ja' beantwoord is, kan getoetst worden voor de aanwezigheid van 1 of meer specifieke slaapstoornis(-sen).

3. Tel per schaal de betreffende item-scores op;
4. Deel de som door het totaal items van die schaal;
5. Bepaal op dit gemiddelde de criterium-waarde voor die schaal overschrijdt.

Schalen	ICSD-2 code	Items								Criterium <sup>1</sup>
Insomnia	307.general	1	7	10	12	13	14	15	21	3.68
Parasomnia	307.41/.42./46	4	16	20	22	24	31			2.42
CRSD	327.-/31./32./33./34	5	10	13	26	27	30			3.41
Hypersomnolentie	327.11	23	25	28	29	32				2.90
RLS-LMS	333.99 / 327.51	2	6	8	9	11				2.70
SBD	327.23	3	17	18	19					2.87

Cut-off waarden voor een optimale balans tussen sensitiviteit en specificiteit (Youden's criterium<sup>1</sup>).